



サツマイモ基腐病対策のポイント①

～植付から初期防除～

問 農林振興課 営農推進係 ☎476-1111 (513)

育苗 植付前には、必ず苗を消毒しましょう！



！対策のポイント

- 採苗は**地際から5 cm以上**離れた位置で切り上げましょう。
- 採苗で使用する**ハサミはこまめに消毒**しましょう。
- 消毒液は**使用日ごとに毎回調整**しましょう。

農薬の名称	対象病害虫	希釈倍率	使用時期
ベンレート水和剤	基腐病、つる割病、黒斑病	500～1,000倍	植付前
ベンレートT水和剤20	基腐病、黒斑病	基腐病200倍、黒斑病20倍	植付前

本ほ 健全なほ場に植えましょう！排水対策を行いましょう！



！対策のポイント

【健全なほ場の選定】

- 基腐病の**発生が無かったほ場**
- 2年以内にさつまいもの作付が無いほ場** (水田、葉たばこ跡地、飼料畑など) などから選びましょう。

【ほ場外への排水をスムーズに！】

- ほ場の均平化**
- 額縁明きよや枕畝の除去**による排水溝を設置し、必ず排水路へ接続する
- 排水路のつまり除去**などを実施しましょう。

ほ場巡回で、発病株の早期発見・抜き取り・早期防除の徹底を！

発生初期の防除が大切だよ！



薬剤の散布例

1回目	2回目	3回目
植付から35日頃 アミスター20 フロアブル 100 L/10 a	1回目から14日後 銅剤 200 L/10 a	2回目から14日後 アミスター20 フロアブル 200～300 L/10 a

台風等の状況に応じ、3回目のアミスター散布を行いましょう

農薬の名称	対象病害虫	希釈倍率	使用液量	使用回数
アミスター20フロアブル	基腐病	2,000倍	100～300L/10a	3回以内
ジーファイン水和剤(銅剤)	基腐病	1,000倍	200～300L/10a	—
Zボルドー(銅剤)	基腐病、斑点病	500倍	100～300L/10a	—